

四庫全書

子部

# 欽定四庫全書

子部

普濟方卷三十四

詳校官太醫院院使<sub>臣</sub>張聲基

編修<sub>臣</sub>倉聖脈覆勘

總校官原任<sub>中允</sub>王燕緒

校對官中書<sub>臣</sub>徐步雲

謄錄監生<sub>臣</sub>李文杞

欽定四庫全書

普濟方卷三十四

明

周王朱楠撰

膽腑門

總論

夫膽腑者主肝也合氣膽膽者清淨之腑也號將軍決  
曹吏重三兩三銖長三寸三分在肝短葉間下貯水精  
汁二合能喜能怒能剛能柔目下果大其膽乃橫凡膽  
腦髓骨脉女子胞此六者地氣之所生也皆藏於陰而象

地故藏而不瀉名曰竒恒之府若胃與大腸小腸三焦  
膀胱此五者天氣之所生也其氣象天故輸瀉受五臟  
濁氣名曰傳化之府此不能久留輸瀉者也所謂五臟  
者藏精氣而不瀉也故滿而不能實六腑者傳化物而  
不藏故實而不能滿也所以然者水穀入口則胃實而腸  
虛食下則腸實而胃虛故曰實而不滿滿而不實也  
左手關上陽絕者無膽脈也若膽夜疼口中苦味譫語  
或如見鬼多驚劣刺足厥陰治在足大拇趾間或刺三

毛中 左手關上陽實者膽實也若腹內不安身軀弱也刺足少陽穴在足上第二趾本節後一寸是膽病中善太息口苦嘔宿汁心澹澹恐如人將捕之咽中介介然數唾候在足少陽之本末亦見其脉之陷下者灸之其寒熱刺陽陵泉若善嘔有若長太息中澹澹善悲恐如人將捕之邪在膽逆在胃膽溢則口苦胃氣逆則嘔苦汁故曰善嘔刺三里以下氣逆刺足少陽血絡以閉膽却調其虛實以去其邪也 膽熱曰脇下痛脹

口苦太息 肝前受病移於膽肝欬不已則嘔膽汁

厥氣客於膽則夢闕訟 肝應筋爪厚色黃者膽厚爪

薄色紅者膽薄爪堅色青者膽急爪軟色赤者膽緩爪真

色白無約者膽直爪惡色黑多敗者膽結扁鵲云足厥

陰少陽為表裏表清裏濁其病若實極則傷熱熱則驚

動精神不守臥起不定若虛則傷寒寒則恐懼頭眩不

得臥發放玄水其根在膽先從頭面患腫至足膽有病

則眉為之病人眉一絲者七日死

膽實熱附論

夫左手關上脈陽者足少陽也為膽實熱蓋實則為有餘有餘則生熱故其證苦神驚不安起居不定胸中冒悶身體弱頭項強口吐苦汁腹中氣滿飲食不下咽乾洒洒寒熱心脇痛不能轉側足外反熱是為陽厥及頭疼目銳眦痛缺盆中腫痛腋下腫馬刀癭皆謂膽氣實足少陽經壅滯故也

龍膽瀉肝湯

出衛生寶鑑

治內熱盛口苦膽瘕乃肝主謀慮

膽主決斷汁計七合清淨之府肝待決於膽志或不決為之怒怒則氣逆膽汁上溢故口苦或熱盛而使然也

柴胡

錢一黃芩

分七

生甘草

人參

天門冬

去心

黃連

龍膽草

知母

山梔子

麥門冬

去心

五味

子

個七

右咬咀都作一服水煎食遠服

菊花散

出聖惠方

治膽經伏熱精神驚悸不安



甘菊花

一兩

牛黃

五錢

犀角

三錢

鐵粉

半兩

黃連

三錢

去鬚

麥門冬

半兩  
去心

獨活

一兩

白附子

半兩  
炮

鉛霜

半兩

右為末每服二錢食後淡竹瀝調下金銀煎湯下亦得一方無獨活有人參甘草

半夏湯

治膽腑實熱精神不寧

半夏

宿薑

各三兩

黃芩

一兩

生地

五兩

遠志

茯苓

各二兩

兩秫米

一斗酸棗仁

五合

右㕮咀長流水五升煮秫米令蠡目沸揚三千餘遍

澄清取九升煮藥取三升半分三服一方治虛煩悶  
不得眠無地黃遠志有麥門冬桂心各三兩甘草人  
參各二兩

酸棗仁圓

出永類  
鈴方

治膽氣實熱不得睡神思不安

茯苓

酸棗仁

去核

遠志

去心

栢子仁

炒

防風

各一兩

生

地黃

枳殼

各半兩

竹茹

二錢半

石為末煉蜜如梧桐子大每服七十丸不拘時熟水

下

升麻湯

出聖惠方

治足少陽經熱積久腹中氣滿睡臥不安

頭昏口苦小便不利膽實熱精神不守

升麻

麥門冬

去心

黃芩

茯苓

去木

大黃

炒

地骨皮

羚羊角

銔下

甘草

炙各等分

右搗篩每服三錢水一盞入青竹茹少許煎七分去

滓溫服食後臨臥忌炙煨物一名麥門冬散

棟實丸

治膽經實熱心神驚悸小便不利

棟實

三兩童子小便浸一宿又火煮爛去皮焙乾

大黃

梔子仁

各一兩炒

人參 赤茯苓

酸棗仁

去皮蛇黃

炒令赤酒浸滓五次各一兩

右除別研外搗羅為末一處拌勻煉蜜如梧桐子大每服在早食後及夜臥用熱水下十五丸至二十丸瀉熱湯 治實熱精神不安之病

龍膽草

酸棗仁

微炒

黃芩

去黑心

茯神

去木

升麻

伏

龍肝

竹茹

甘草

炙各等分

右搗每服三錢水一盞煎至七分去滓食後溫服日

三

瀉膽湯

出永類  
鈴方

治膽經實熱反洒洒寒熱腹中氣滿脇

下硬口苦咽乾頭疼不欲飲食

半夏

三兩湯  
泡去滑

生地黃

五兩

酸棗仁

二兩

黃芩

一兩

遠志

去心茯苓

各二兩

甘草

一兩炙

右剉散長流水一斗糯米一升煮蟹眼沸揚二三千

遍澄清每用水二盞抄藥四錢匕薑七片煎七分去

滓不以時服

流水湯 治膽實生熱腹中氣濁飲食不下咽乾頭重

洒洒惡寒兩脇眼痛

半夏

一兩湯洗炒

酸棗仁

二兩

黃芩

半兩去黑心

赤茯苓

一錢

梔子

去皮

生地黄

遠志

各一兩去心

右除別研外搗篩再拌勻每五錢用東流水二盞入

秫米半升薑五片煎一盞去滓溫二服空心食後各

一服一方無地黄

枳殼湯

出聖惠方

治膽經有積熱腹中氣滿不安咽乾頭重

心神驚悸小便不利一名人參散

枳殼

一兩炒  
去瓢

人參

葵子

甘草

各半  
兩炙

赤茯苓

黃芩

各三  
兩

右搗篩每服三錢水一盞入生薑三片煎七分去滓

溫服不計時

山梔子飲

治肝膽邪熱神思不寧喜怒狂躁口苦舌

乾

山梔仁

一兩  
半

竹茹

一兩

豆豉

一升

大青

八錢

陳皮

一兩

湯  
浸去白

右搗篩每服三錢水一盞蜜少許煎七分去滓溫服

食後臥各一服

胡黃連丸

出聖惠方

治膽經熱精神不寧臥起不安口中常

苦

胡黃連

一兩

羚羊角

一兩屑

蛇黃

半兩火煨

熊膽

一分

青黛

一分

別研

右為末研令勻用黃牛膽丸如菉豆大每服七丸煎竹葉湯下晚間再服無牛膽以羊膽代

膽虛寒

附論



夫左手關上脈陽虛者足少陽經也為虛寒蓋膽虛則生寒寒則其病恐懼不能獨臥口苦善太息嘔宿汁心下澹澹如人將捕之噓中介介數唾頭眩痿躄足指不能拳指不能搖坐不能起頸僵視俛蓋膽虛精神不守其氣上溢循其所在而生病也

薯蕷丸

出聖惠方

治膽經虛冷精神不守常多恐懼目暗頭

昏四肢不利

薯蕷丸

兩

白茯苓

兩

決明子

三錢

兔絲子

一兩

酒浸

焙乾

別研

為天雄一兩炮防風三錢栢子仁三兩熟地黄一人參

一兩山茱萸三錢黃耆三錢遠志去心桂心三錢酸棗仁各三錢

右為末煉蜜丸梧桐子大每服三十丸溫酒服下

中正湯

出聖惠方

治膽氣不足常多恐懼頭眩痿厥四肢

不利僵仆目黃失精一名酸棗散

茯苓

去皮

酸棗仁

黃耆

羌活

各一兩

甘菊花

熟

地黃

栢子仁

防風

各一兩

人參

白芍藥

當

歸甘草

各半兩炙

右搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服不拘

時忌生冷猪魚

遠志湯

出聖惠方

治膽經虛冷不能獨臥心下澹澹如人將

捕之頭昏痿厥目失精一名茯神散

遠志

去心

熟地黄

各一兩

防風

人參

甘菊花

白

朮

桂皮

去粗

茯神

前胡

去節各三錢

枳殼

半兩去酥麩炒

右搗篩每服三錢水一盞生薑三片煎七分去滓不

拘時候

茯苓湯

出永類  
鈴方

治膽氣痿虛冷頭眩痛心神恐畏遇事

多驚不能獨臥腦中滿悶口苦

茯神

去木  
一兩

酸棗仁

黃耆

白芍藥

五味子

栝子仁

各一  
兩

桂心

熟地黄

酒洗

人參

甘草

各半  
兩炙

右咬咀每服四錢水一鍾薑三片煎七分去滓溫服

不拘時

天雄丸

治膽虛生寒氣溢胸膈頭眩口苦喜太息嘔

宿水

天雄炮去皮 人參 山芋 桂去粗皮 黃耆 白茯苓

去皮 防風 栝子仁研 山茱萸 酸棗仁炒各三錢

右除栝子仁外搗細末與栝子仁和勻煉蜜為劑杵  
丸梧桐子大每服三十丸溫酒空心食前下

黃耆湯 治肝虛膽寒心神不安臥即驚覺目昏心躁  
四肢不利多恐

黃耆蜜炙 人參 檳榔剉 白朮 百合 酸棗仁

炒 白茯苓去皮 麥門冬去心 桂去皮 附子炮去臍皮

右咬咀每服五錢水一盞半薑五片煎至一盞去滓  
溫服空心食前

沉香湯 治足少陽經不足目眩痿厥口苦嘔水多睡

沉香 白茯苓去皮 黃耆 白朮各一兩 芎藭 熟地

黃 五味子各三分 枳實去瓢 桂各半兩

麩炒 去皮

右搗篩每服三錢水一盞薑三片煎七分去滓不拘  
時服

犀角飲 治膽受冷精神不安眼昏目暗臥起不定

犀角

一兩 鎔屑

羌活

一兩 去蘆

酸棗仁

二錢 炒

茯神

三錢 去木

甘菊

花

一兩 防風 錢三

人參

柴胡

一兩

右搗篩每服五錢水一盞半煎八分去滓溫服

人參湯

一名酸棗湯

治膽虛煩勞精神不守奔氣在胸眠

臥不定多恐

方見本門 膽虛不得眠類

決明子丸

出聖惠方

治膽虛膽冷神思昏沉頭眩目暗

決明子

天雄

炮去皮臍

栢子仁

兔絲子

酒浸三日 焙乾別研

為熟地黄

枸杞子

各一兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三十丸溫酒空心下晚服

膽熱多睡

附論

夫積熱多睡者膽實清淨決斷所自出今肝膽俱實榮衛壅塞則清者濁以故陰陽不和胃膈多痰臟腑壅滯精神昏憤常臥皆積熱不除膽氣實故多睡也

茯神散

出聖惠方

治膽熱多睡神思不安昏悶

茯神

去皮

麥門冬

地骨皮

茯苓

各一兩又一方用黃芩

白



蘚皮 酸棗仁 沙參 各半 甘草 半兩

右末每服三錢水一盞煎六分去滓食後服 一方有

屑

麥門冬湯

出聖惠方

治榮衛氣澁精神不守及膽熱多睡頭

目昏眩

麥門冬

去心

天門冬

去心

羚羊角

三錢各

木通

前胡

去節

大黃

各四錢

半夏

炒

甘草

炙

防風

各半兩

右搗篩每服三錢水一盞薑三片煎六分去滓食後

服忌羊血

遠志丸 治氣昏多睡晝夜不足

遠志

去心

人參

山芋

防風

玄參

各二兩半

苦參

鐵粉

細研

烏頭

燒灰存性各三兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大食後米飲下二十丸再

漸加至三十丸

人參散

出聖惠方

治膽經熱心神昏悶多睡

牛黃

一錢研

羌活

三錢

遠志

三錢去心

升麻

半兩

麥門冬

二兩去心

人參

三錢

犀角

半兩

赤芍藥

一兩

右為末每服一錢薄荷溫水調下忌豬肉濕麵等食

後服

遠志丸

出聖惠方

治膽熱多睡

遠志

三錢去心

人參

一兩

馬頭骨

三錢

茯神

三錢

菖蒲

半兩

硃砂

半兩研飛過

鐵粉

半兩

右為末入硃砂等分令勻煉蜜丸如梧子大每服十

丸食後服

半夏湯

治膽熱精神不守昏悶多睡方見本門膽實

熱類

黃連湯

出楊子  
護命方

治膽熱口苦神昏多睡左手關脈實

大宜服此方

黃連

去  
鬚

黃芩

赤茯苓

去  
皮

麥門冬

去  
心

升麻

各一  
兩

右搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服食後

治膽熱多睡

出聖  
惠方

馬頭骨灰

一兩

鐵粉

一兩

硃砂

半兩

水飛過

龍骨

半兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服五丸竹葉湯食後服

酸棗仁湯 治膽風毒氣虛不調昏困多睡

酸棗仁

一兩研  
生用

臘茶

二兩生薑  
汁塗炙焦

右搗篩每服二錢水一盞煎七分去滓溫服

治多睡 本草

取白馬頭骨作枕枕之

治人嗜眠喜睡 本草

父鼠目一枚燒作屑魚骨和注外若不眠薰取二  
物紗袋子盛貯之

膽虛不得眠

附論

夫膽虛不得眠者是五臟虛邪之氣干淫於心心有憂  
患伏氣在膽所以睡臥欠安心多驚悸精神怯弱蓋心  
氣憂傷膽虛冷致不得眠也又有大病之後腑臟尚虛  
榮衛不和生於冷熱邪客於陰陰氣虛木氣獨行於陽下  
不依於陽故令不得睡也

千里流水湯

一名溫膽湯

治膽虛不得眠及膽虛頭眩厥足

痿指不能搖臂不能起僵仆目黃失精虛勞煩擾因

驚膽懾奔氣在胃喘急浮腫不睡

麥門冬

去心

半夏

各三兩湯浸

茯苓

四兩

酸棗仁

二升炒

甘草

炙

桂心

黃芩

遠志

去心

草薢

人參

各二兩

生薑

二

秫米

一斗

石千里水一斛煮米令蠡目沸揚萬遍澄清取一斗

煮藥取二升半分三服一方無生薑

酸棗仁丸

治膽虛睡不安精神恐怯

酸棗仁

二兩研

人參

白朮

白茯苓

去皮

半夏

炒

乾

薑

各一兩炮

陳皮

去白

榆白皮

剉

旋覆花

前胡

各一兩

檳

榔

五枚

右末煉蜜丸如梧桐子大空心煎棗湯下二十九丸加

至三十丸

茯神散

一名遠志湯

治膽經虛冷目眩頭疼心神恐畏不能

獨處胸中滿悶方見本門膽虛寒類



治煩悶不得眠

枸杞

兩五

生地黄

兩五

麥門冬

甘草

前胡

兩各三

茯苓

苓

知母

兩各四

人參

兩二

粟米

豉

錢各五

右呖咀水八升煮三升七分四服

五補湯

治肝虛膽寒夜間少睡即驚覺心悸神思不

守目昏心躁肢節痿弱補肝去膽寒和氣方見本門

虛寒類

人參散

出本方

治膽氣虛常多畏心恐不能獨臥如人將

捕之頭目不利胸中悶

人參 枳殼 五味子 桂心各三兩 栝子仁 熟

地黃各二兩 山茱萸 甘菊花 茯苓 枸杞各二兩

右細末每服二錢溫酒調服

五味子湯出楊子建護命方 治膽經虛冷頭痛心中驚悸睡臥

不安常如人將捕之精神不守

五味子 白茯苓去皮 人參 芎藭 遠志去心 酸棗

仁 熟地黃焙 麥門冬各一兩去心 桑寄生半兩

右搗篩每服三錢水一盞棗二枚煎七分任意服

酸棗仁湯

酸棗仁

升五人

參

桂心

生薑

兩各三

石膏

茯苓

知母

兩各三

甘草

兩半

右搗篩水一斗煮酸棗仁取七升去滓下藥煮三升

分為三服日三

補膽防風湯

出本  
事方

治膽虛目暗喉痛唾數眼目眩暈五

色所障夢見人訟恐懼面色變青

防風

錢一

人參

分六

細辛

分五

芎藭

甘草

茯苓

獨

活

前胡

各三分

右搗篩每服四錢水一盞半棗二枚煎八分去滓食

前服

茯神散

出聖惠方

治膽虛不得睡神思不安

茯神

一兩

栢子仁

半兩

酸棗仁

一兩

黃耆

一兩

人參

一兩

熟

兩

地黃

半兩

遠志

五味子

各半兩

右為末每服一錢溫酒調下不拘時服

溫膽湯

出永類  
鈴方

治心膽虛怯觸事易驚夢寐不祥異象

所感遂使心驚膽懾氣鬱生涎涎與氣搏變生諸證  
或短氣悸乏或復自汗四肢浮腫飲食無味心虛煩  
悶坐臥不安大病後虛煩不得眠此膽寒故也服之  
效

半夏

竹茹

枳實

各三兩  
麵炒

陳皮

三兩

甘草

茯苓

一兩  
半

人參

一兩

右剉散每服三錢水一盞半薑五片棗二枚煎至八

分食前服未效加遠志去心薑炒北五味子各一兩  
酸棗仁一兩蜂蜜粉炒一方無人參用白朮

鯪魚甲丸

出聖惠方

治膽虛不眠四肢無力

鯪魚甲

酸棗仁

羌活

黃耆

牛膝

人參

五味子

等分

右為末煉蜜杵丸梧桐子大每服三四十九丸溫酒下

忌葷菜

酸棗仁丸

出衛生寶鑑

治膽氣虛熱不睡膽經不足心經受

熱精神恍惚恐懼多驚情思不安時有盜汗虛煩不眠  
朝差暮劇或發眩暈

酸棗仁

炒

地榆

各一兩

丹砂

炒研

茯神

人參

菖蒲

各半兩

右除丹砂外搗末入丹砂令勻蜜和丸梧桐子大每  
服二十丸米飲下不拘時硃砂為衣煎人參湯下

酸棗仁煎

出聖惠方

治膽虛不睡

酸棗仁

五兩炒取二兩半

乳香

二兩蜜四兩

牛黃

一錢研

糯米

二合

炒為末 硃砂

半兩研  
水飛過

右用酒一鍾和蜜等一處慢火煎如沸不計時以溫酒調下一茶匙

山芋丸 治膽虛冷精神不守寢不寧頭目昏眩恐畏不能獨處

山芋 酸棗仁

各一兩炒

栢子仁

茯神

山茱萸

各三

錢

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三十丸溫酒下米



飲亦得不拘時服

人參散

一名安神散

治膽虛睡臥不安多驚

出聖惠方

人參

白茯苓

各一兩

茯神

一兩去木

丹砂

半兩別研

右搗為末每服一錢粥飲調下不拘時服一方無茯

神

酸棗仁丸

出聖惠方

治膽虛不得眠

酸棗仁

微炒

地榆

一兩

茯神

一兩去木

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十丸米飲下無

時

乳香散

治膽虛不得眠精神恍惚

乳香

一兩研

酸棗仁

二兩

馬頭骨灰

一兩

石研細末每服二錢溫酒調下不拘時

治膽虛夜不眠

出聖惠方

用酸棗仁半兩炒黃研末酒三合浸汁先以粳米三合

煮作粥候熟下棗仁汁更煮三五滾空心食一方為

末每服三錢竹葉湯下又白苣菜常食之令人輕身

少睡調和十二經脈利五臟此出本草

治人夜睡言語

出本草

以靈床下果子食之佳

治臥床不寤

出本草

勿以火照火照之殺但痛啣其踵及足拇指甲際而  
多唾其面即活又井底泥塗目畢令人垂頭於井中  
呼其姓名便起

治從早夜連時不得眠

暮以新布瓦火炙以熨目并蒸大豆便裝囊成枕枕冷後更湯熱終夜常枕熱豆即立愈

治食飲不得息

出本草

葶藶子三兩炒黃研末以水三升煮大棗三十枚得汁一升內藥中每服如棗大煎取七合頓服

酸棗仁湯

出本草

治驚悸不眠

以酸棗仁二升茯苓白朮人參甘草各二兩生薑六兩六物切以水八升煮取三升分四服

酸棗仁湯

出本草

主虛不得眠煩不可寧

以酸棗仁二升蜩母乾薑茯苓芡各二兩甘草一兩炙並切以水一斗先煮棗煎三升後內五物煮取三升分服一方加桂一兩

膽痺

夫內經謂有病口苦名曰膽痺膽為中正之官清淨之府十一臟之所取決咽為之使若數謀慮不決則膽虛氣上溢而口為之苦臟主藏而不瀉今數謀不斷則清

淨者濁而擾矣故氣上溢而其證為是也經所謂是動則病口苦以氣為是動也

半夏茯苓湯 治謀慮不決膽氣上溢致口苦神思不爽

半夏

湯洗去滑炒

赤茯苓

去皮

麥門冬

去心

酸棗仁

桂

黃芩

去皮

遠志

去心

人參

各二兩

甘草

一兩半炙

右搗篩每服五錢水一盞半薑五片秫米一匙頭許

煎一盞去滓溫服不拘時

地骨皮湯

治謀慮傷膽膽氣上溢膈腕虛煩常覺口

苦

地骨皮

生地黄

各五兩

前胡

二兩半

茯神

二兩

麥門冬

去心知母

人參

甘草

各二兩炙

右搗篩每服五錢水一盞半入脫粟米各少許同煎一盞去滓溫服不拘時

麥門冬湯

一名升麻湯

治膽虛氣逆口常苦煩躁引飲方見

本門膽實類

益膽湯

出聖惠方

治肝膽俱虛熱氣上薰口中常苦煩渴臟

腑因虛致熱

黃芩

甘草

各二兩炙

人參

桂

各一兩去皮

苦參

茯苓

各半兩去皮

右搗篩每服三錢水一盞半煎七分去滓溫服不拘

時

梔子湯

出聖惠方

治腹熱氣逆口苦煩濁

梔子仁

二十枚

升麻

黃芩

大青

茯苓

去木各二錢



甘草

半兩  
炙判

右搗篩每服三錢水一盞豉五十粒煎七分去滓入

蜜半合更煎三二沸食後溫酒服忌熱麵炙燂等

人參湯

一名枳  
殼湯

治膽虛氣逆邪熱攻衝口苦煩渴方見

本門膽實熱類

普濟方卷三十四

欽定四庫全書

普濟方卷三十五

明周王朱橚撰

胃腑門

總論

夫胃腑者主脾也口唇者是其候也脾合氣于胃胃者水穀之府也號倉庫守內嗇吏重二觔十四兩迂曲屈伸長一尺六寸大一尺五寸徑五寸受水穀三斗五升其中常留穀二斗水一斗五升廣眇大頭弦胃五穀乃

容而滿上焦洩氣出其精微慄悍滑疾下焦不下溉洩  
諸小腸腸胃所受水穀之數也凡平人無不皆然故胃  
滿則腸滿胃虛則腸虛更滿更虛氣得上下五臟安定  
血脈和利精神乃居故神者水穀精氣也五臟不足調  
施于胃故腸胃之中常留穀二斗四升水一斗一升故  
人一日再至後二升半一日中五升七日五七三斗五  
升而留水穀盡故好人不飲不食七日而死者水穀精  
氣津液皆盡故七日而死 右手關上陽絕者無胃脈

也若吞酸頭痛胃中有冷刺足太陰治陰在足大指本  
節後一寸 右手關上陽實者胃也若腸胃中伏伏不  
思食得食不能消刺足陽明治陽在足上動脈 脈浮  
而芤浮則為陽芤則為陰浮芤相轉胃氣生熱其陽  
則絕 趺陽脈浮大者此胃家微虛煩躁必日再行動  
作頭痛重熱氣盛者居胃胃脈搏堅而長當病其色赤  
當病析髀其斬而散者當病食痺髀痛病先發于胃脈  
滿五日之腎少腹腰脊痛脛疼三日之膀胱背臂筋痛

小便秘五日上之心脾心痛閉塞不通身體痛重三日  
不已死冬夜半後夏日暎 胃病者腹臙脹滿胃管當  
心穴而痛上支兩脇膈咽不通飲食不下下取三里穴  
飲食不下隔塞不通邪在胃管在上管則抑而刺之在  
下管則散而去之 胃脹者腹滿胃管痛鼻聞焦臭妨  
于食大便難 胃中有癖食冷物者痛不能食食熱則  
能食脾前為病移于胃脾欬不已嘔吐長蟲 厥氣客  
于胃則夢飲食 診得胃脈病形如何曰胃脈實則脹

虛則洩脹脾應肉脰肉脰堅大胃厚肉脰麼者胃薄肉  
脰小而麼者胃不堅肉脰不補其身者胃下胃下者脫  
約肉脰不堅者胃緩肉脰無小果瘰癧堅者胃急肉脰  
多小果累者胃結胃結者上脫約不利 扁鵲云足太  
陰與陽明為表裏脾胃若病實則傷熱欲飲水漿常渴  
虛則傷寒寒則苦饑常痛發于風木其根胃先從四肢  
起腹滿大通身腫 胃絕不治五日死何以知之舌腫  
溺血大便赤洩 咽者嚙物之門戶也膈者上焦胸中

心肺之分野不通者升降之氣上不得交又云清氣在下則生飧洩洩黃如糜米穀不化者是也濁氣在上則生臌脹中臌滿不得下大便難或先結後溏皆是症也濁氣在上當降而不降者乃腎肝吸入之陰氣不得下而逆在上也胃氣逆上或為嘔或為吐或為噦者是陰火之邪上衝而吸入之氣不得入故食不下也此皆氣衝之火逆胃之脈反上而作者也清氣在下則生飧洩者胃氣未病之日當上行心肺而經營也因飲食失節



勞役形體心火乘于土位胃氣弱而下陷于陰中故米穀入而不升遂降而為飧洩也膈咽之間交通之氣不得表裏者皆衝脈上行逆氣所作也蓋胃病者上支兩脇膈咽不通飲食不下取三里者是也鍼經云清之與濁相干亂于胸中是為大悞者惑也氣不交通最為急證不急去之諸變生矣聖人治此有要法陽氣不足陰氣有餘先補其陽後瀉其陰是先令陽氣升發在陽分而後瀉陰也春夏之日陽氣在經當益其經脈去其血絡秋冬陽氣降

伏當先治其臟腑若有噎有塞塞者五臟之所生陰也血也噎者六腑之所生陽也氣也二者皆由陰中伏陰而作也

胃實熱

附論

夫右手關上脈陽實者足陽明經也病若渴引水頭痛汗不出如溫瘧唇口乾善噦乳癰缺盆腋下腫痛腹脹心懸消穀喜饑溺黃名曰胃實熱也 胃氣盛熱則壅滯不宣蘊積生熱面目悲黃譫妄狂周身熱多汗腹脇堅滿大便秘難皆其證也

方

凝神散

出脈數  
鈴方

收斂胃氣清涼肌表

人參 白朮 茯苓 山藥 白扁豆 粳米

各一兩

知母 生地黃 甘草 淡竹葉 地骨皮

各五錢

麥門冬

各二錢半

右咬咀每服三錢水一盞薑三片棗一枚煎不拘時

候服

清陽湯

出濟生  
拔粹方

治口喎頰顙急緊胃中火盛必汗不止

而小便數

升麻

黃耆

當歸

各二錢

葛根

一錢半

紅花

桂枝

酒黃蘗

各一分

甘草

一錢

蘇木

甘草

生各半錢

右㕮咀作一服酒三大盞煎一盞三分去滓稍熱食

前服訖以火熨其緊結處即愈夫病口喎筋急者是筋脈血絡中大寒此藥以代燭針劫刺破惡血以去其凝血內作泄衝脈之火熾

通熱湯

出聖惠方

治胃氣實熱苦頭痛汗不出口中乾燥

一名

子苓散

人參

二兩

甘草

炙一兩

柴胡

去黑心

葛根

剉

麻黃

去根節

白

茯苓

去黑皮各一兩  
一用赤茯苓

黃芩

去黑心

五加皮

各半兩剉

石膏

三合  
碎

右咬咀每服三錢水一盞生薑三片煎七分去滓溫服一方無人參

加味大黃湯 治面熱如醉此為胃熱上薰其面加大黃以利之

茯苓

四兩

甘草

乾薑

細辛

大黃

各三兩

五味子

半夏

杏仁

各半

右水一斗煮三升去滓溫服半升日三

橘皮竹茹湯

永類  
鈴方

治胃熱多渴嘔噦不食

赤茯苓

去

橘皮

去

枇杷葉

刷去  
毛

麥門冬

去

青竹茹

半夏

各一兩湯  
泡七次

人參

甘草

各半  
兩炙

右咬咀每服四錢水一盞半薑五片煎八分去滓溫

服無時

黃芩梔子湯

聖惠方

治胃氣實熱頭痛寒熱狀如溫瘧

唇口乾燥或生乳癰腋下腫

黃芩

去黑心

梔子仁

犀角

鎔

赤茯苓

去黑皮

赤芍藥

各一兩

射干

一兩

大黃

半兩對炒

右咬咀每服五錢水二盞煎一盞入生地黄汁半合

蜜一匙攪勻更煎數沸去滓食後溫服一方無芍藥

忌炙煨熱麵

黃芩湯

聖濟總錄

治胃氣實熱口舌乾燥頭痛煩渴

黃芩

去黑心

紫苑

各一兩  
去苗

葛根

剉

赤芍藥

各三兩

甘草

半兩

石膏

二兩  
碎

右咬咀每服三錢水一盞煎七分去滓溫服不拘時

洩熱蘆根散

聖惠方

治胃實熱常渴引飲水

蘆根

剉

栝蒌根

麥門冬

各一兩  
去心

赤茯苓

知母

甘草

各三錢

右咬咀每服三錢水一中盞入小麥五十粒竹葉二十七片生地黃一分生薑半分煎六分去滓食後溫



服

黃連丸

聖惠方

治胃實熱氣盛消穀善飲頭目痛衄血煩

渴

黃連

去須

栝蒌根

麥門冬

去心焙

知母

焙

茯神

各一兩去

木

右為末煉蜜丸梧桐子大每服三十丸熱水下不拘

時粥飲下亦可

前胡湯

聖濟總錄

治胃實熱乾嘔煩悶目黃燥渴

欽定四庫全書

前胡

一兩半  
去蘆頭

茅根

二兩  
剉

麥門冬

去心  
焙

甘草

各一兩

黃

芩

半兩  
去黑心

右咬咀每服二錢水一盞煎七分去滓溫服不拘時

茯苓散

聖濟  
總錄

治胃腑實熱發渴飲水漿不止

茯苓

去木剉  
一兩

枯薑根

麥門冬

各三兩半  
去心焙

歲時

知母

各二兩  
焙

右咬咀每服先以水三五盞煮小麥一合淡竹葉一

錢沸去滓然後下藥末五錢生地黃半錢棗一枚擘

破煎一盞去滓溫呷

清胃散

濟生  
拔粹

治因服補胃熱藥而致上下牙痛不可忍

擇引頭腦滿熱發大痛此足陽明別絡入腦也喜寒惡熱此陽明經中熱盛而作也

升麻

一錢

牡丹皮

半錢

當歸身

生地黄

各三錢  
酒製

淨黃

連

六分不好加二分夏  
月倍加之無易法

右以咀作一服水一盞半煎七分去滓稍冷服

赤芍藥湯 治胃氣實熱煩躁多渴唇焦口乾引飲不

止方見脾臟門脾痺類

黃連丸

聖濟總錄

治胃氣實熱煩躁多渴

黃連

去須

赤茯苓

各三兩去黑皮

麥門冬

一兩去心焙

苦參

半兩

右為末煉蜜丸梧桐子大每服三十丸食後臨卧竹

葉湯下

犀角飲

聖惠方

治實熱嘔噦吐逆不食頭痛煩渴

犀角

鎔

枇杷葉

炙去毛

麥門冬

去心焙

葛根

各一兩剉

右㕮咀每服三錢水一盞煎七分去滓溫服不拘時

一方有生薑半分

葛根湯

出聖濟總錄

治胃實熱煩渴咽乾吐逆

葛根

十兩對汁

甘草

三兩炙

半夏

二兩生薑汁半盃水半升同浸焙乾

右咬咀每服三錢水一盞生薑二片竹茹少許煎七分去滓溫服不拘時

地黃飲

聖濟總錄

治胃氣實熱唇口乾燥頭昏體倦五心煩

熱

生地黃

汁

生薑

汁

藕節

生蜜

各二合

右調和令勻分三服不拘時

地骨湯

聖濟總錄

治胃氣盛實壅塞不宜蘊積為熱口渴煩

地骨皮

二兩

防風

去

甘草

各一兩炙

右㕮咀每服三錢水一盞半煎一盞去滓食後溫服

薑汁飲

一名三和飲子

治胃中實熱吐逆心煩不下飲食

治通利腸胃除胸中煩熱解酒渴

用菰菜二斤煮作羹啜之止作韭菰食亦得

治胃痺熱中陰渴止痢小便益氣力補虛輕身長年

用粱米炊飲食之

理胃中熱去身腫健脾消穀止脹

用大豆一升煮令熟杵米飲服之

補氣湯

十便良方

生胃中津液并治上焦虛熱夜卧口乾

五味子

三兩須用遼東

甘草

半兩

白鹽

一兩炒三件同拌于器中經一宿取出焙

乾

吳茱萸

一錢

右為細末乾淨磁瓶中盛每以熟湯不拘時點一盞

服

治胃氣實熱口乾唇裂中心熱燥大腸祕非時煩渴睡

中口内生涎

楊子建萬全護命方

大黃

半兩

桔梗

枳殼

只使青

前胡

葛根

梔子

各一

錢

右件細搗羅為末每服二錢匕水一盞生薑三片同煎取八分食後和滓喫

平胃散

醫方集成

治胃經實熱口乾舌裂大小便秘澀及熱

病後飲熱不除畜于胃中四肢發熱口渴無汗



厚朴

去皮薑炒

射干

米泔浸

升麻

茯苓

各半兩

芍藥

一兩枳

穀

去麴炒

大黃

蒸

甘草

各一兩炙

右㕮咀每服四錢水一盞煎七分空心食前服

治胃中熱下氣

本草

以溲䟽作湯浴之

若病胃脹滿心胃悶發熱

本草

即用菴耳服之

治胸胃熱氣

本草

以蛇母草絞汁食之効

升麻湯 治瀉胃食熱方見本門

胃虛冷

附論

夫胃合于脾陽明是其經也為水穀之海凡五味五穀入口則胃實而腸虛食下則腸實而胃虛六腑實而不滿五臟滿而不實臟氣不足調之於胃胃虛則生寒寒則苦饑心腹恒痛兩脇虛脹善鳴時寒時熱唇口乾咽候不利飲食不下面目浮腫浙浙惡風目中急足脛

寒不得安臥則是胃虛冷之候也

健脾丸 治虛勞羸瘦身重胃冷飲食不消洩瀉不止

或作帶下變五色噦臭

鍾乳粉

赤石脂

各一兩半煨

枯礬

乾薑

炮 茯苓

酒浸

石斛

酒浸

五味子

桂心

澤瀉

桑上寄生

遠

志

去心焙

人參

栢子仁

當歸

酸石榴皮

龍骨

煨

天雄

炮去皮臍

牡蠣粉

白頭翁

去苗

甘草

各一兩炙

右為末蜜丸梧桐子大米湯下三十丸空心服

硃砂丸

出聖濟總錄

治胃氣虛冷不思飲食

陳橘皮

湯浸去白焙

桂

去粗皮

乾薑

炮

當歸

切焙

厚朴

去粗皮薑

汁炙

芎藭

胡椒

縮砂

去皮

甘草

炙

附子

各四兩炮去皮臍

白朮

三兩

五味子

一兩半

右除別研外為末用銀石鍋好酒一升白蜜一十兩  
先下硃砂二兩阿魏半兩青鹽二兩好麩一兩煎煮稀  
稠成糊入藥末和劑熟杵丸梧桐子大每服二十九  
生薑鹽湯送下不拘時

調中散

出直指方

治腸虛洩瀉止嘔進食

藿香葉

縮砂

蓬朮

炮

肉桂

草果

各半兩

麥芽

炒

益智仁

橘紅

各三錢

蒼朮

炮

神麴

炒

桔梗

各一兩

甘草

三錢炙

右用乾薑茴香各半兩為末每三錢薑棗少鹽煎服

木香散

出衛生家寶方

治臟寒冷極及久冷傷敗口瘡下洩米

穀不化飲食無味肌肉瘦痒心多嗔恚虛陽上衝婦

人產後虛冷下洩及水瀉冷痢

木香

一兩

破故紙

一兩

良薑

砂仁

厚朴

各三兩  
薑製

赤

芍藥

陳皮

肉桂

白朮

各半兩

胡椒

茱萸

各一

兩

肉豆蔻

四

檳榔

一個

右為末每三錢用不經水猪肝四兩批片重重糝藥漿水一碗醋入茶脚少許入瓶蓋覆煮熟入鹽蔥白三箇薑切一彈大同煮水欲蓋空心作一服冷食之初微澹不妨此是逐下冷氣少時自住經年冷痢滑洩只是一服渴則飲粥湯忌冷油膩如不能則漿水

煖食之若只用漿水煮豬肝九梧子大每服五十九  
用粥湯下若暴瀉只一服一方用銀石器盛煮

熟乾地黄散

出聖惠方

治胃中虛冷肌肉不榮身體枯燥骨

節皆痛

熟地黄

一兩

白茯苓

三錢

當歸

三錢

麥門冬

三錢

乾

薑

半兩

川椒

一分

去目并閉

吳茱萸

一分

桂心

一分

炒

甘草

半兩

人參

一兩

五味子

三錢

木香

三錢

分

右為末每服二錢溫酒食前調下忌生冷

丁香溫氣湯

出百一選方

治胃寒嘔吐涎沫

張上舍名萃云其母常服有効

丁香

吳茱萸

湯浸炒

桂心

各一兩去粗皮

附子

炮去皮臍

黃耆

去蘆白茯苓

各三兩

人參

去蘆半夏

湯炮七次

良薑

白茅

各一兩

兩

甘草

七錢炙

訶子

三錢麩果煨去核

沉香

少許

無時服

右咬咀每服四錢水一鍾半薑五片棗二枚煎七分

調衛湯

出濟生拔粹方

治補胃氣虛弱表不任外寒

黃耆

一錢

麻黃根

一錢

生甘草

半錢

猪苓

二分

羌活

七分

麥門



冬三錢當歸半錢生地黃三錢生黃芩半錢五味子七個蘇

木一分紅花一分半夏半錢湯浸七次

右咬咀每服水二盞去滓稍熱服中風証必自汗汗多不得重發汗故禁麻黃而用根節也

茯苓湯出聖濟總錄治胃冷不思食痰逆多吐

白茯苓一兩半夏一兩人參一兩丁香半兩陳橘

皮一兩木香半兩白朮一兩檳榔半兩草豆蔻二兩

桂三錢厚朴一兩枳殼半兩炒去粗皮

右吹咀每服三錢水一盞煎七分不拘時去滓溫服  
人參補虛湯 治胃虛苦飢寒痛

人參 當歸 茯苓 桔梗 芎藭 橘皮 厚

朴各三兩 桂心 甘草 白朮 吳茱萸二兩 大麥蘖

炒 二升

右用水一斗二升煮三升去滓分三服忌海藻菘菜  
桃李雀生肉葱猪肉酢物等

藿香養胃湯 治胃虛不食四肢痿弱行立不能皆由陽

明虛宗筋無養遂成痿躄

藿香 白朮 白茯苓 神麴炒 烏藥去木 縮砂仁

薏苡仁炒 半夏麴 人參 華澄茄 甘草各半兩

右切每服四錢水一盞生薑五片棗二枚煎七分去

滓無時候服

人參附子湯聖濟總錄 治胃氣冷不思食

人參 附子炮去皮 桂心去粗皮 半夏湯浸焙 枳殼去麩炒

丁香 陳橘皮 白朮 草豆蔻各一兩去皮 甘草錢一

半乾薑三錢  
炮

右呖咀每服三錢生薑二片水一盞煎七分去滓溫

服

人參散

出聖惠方

治胃中虛冷胸膈脹滿四肢不利

人參

三錢去蘆

白朮

赤茯苓

黃耆

各半兩剉

附子

三錢炮去

皮木香

大腹皮

各半兩剉

甘草

一錢炙剉

陳橘皮

湯浸去白焙

去

訶梨勒

煨去核各一兩

桔梗

一兩半去蘆

右呖咀每服三錢水一盞煎至六分去滓食前溫服

白朮散 治胃冷氣脹滿悶四肢急體重

白朮

訶梨勒

各三兩  
去核

甘草

炙

丁香

厚朴

去粗  
皮薑

汁炙各  
一兩

木香

桂

去粗  
皮

人參

檳榔

半生半熟  
各三兩

陳

橘皮

草薺薏仁

各二兩  
去皮

右為末每服二錢生薑木瓜煎湯調下

人參散 補虛寒身枯絕諸骨節皆痛

人參 甘草

細辛

各六分

麥門冬

桂心

當歸

各七分

乾薑

二分

遠志

一分

吳茱萸

二分

蜀椒

三分

右治下篩食後酒服方寸匕

大七香丸

出和劑方

治男子婦人脾元氣冷胃氣虛乏不思

飲食心膈噎塞漸成隔氣脾洩痢氣刺疰中酒冷瘕

翻胃霍亂吐瀉並皆治療

香附子

一百九十  
二兩炒

麥蘖

一百  
兩炒

丁香皮

三百三十  
兩

縮砂

仁

藿香葉

各二百  
五十兩

甘松

煉

烏藥

各六十  
四兩

陳橘皮

二百五十  
兩洗去白

肉桂

去粗皮

甘草

各三百  
五十兩

右為末煉蜜丸彈子大每服一粒鹽湯鹽酒嚼下婦

人脾血氣如經水不調並用炒薑酒嚼下醋湯亦得  
忌生冷及肥膩之物大有神効

丁香丸

出聖濟  
總錄

治胃氣虛冷

丁香 乾薑 吳茱萸炒 五味子 訶子 檳榔

各半  
兩

厚朴

薑汁  
炙

桃仁

各一兩  
去皮尖

木香

青橘皮

各五  
錢去

白

右為末煮棗肉丸如菉豆大每服十九橘皮湯下

補胃煮散

出聖  
惠方

治胃中虛冷惡寒洒卧而不寐少氣口

苦身體虛弱

細辛

一兩半

栝子仁

人參

芎藭

各一兩

防風

桂

去陳皮

各半兩去白

吳茱萸

三錢水浸一宿炒

甘草

二錢黃耆一兩

右為末每服二錢水七分煎沸通口服一方呿咀生

薑半分棗三枚水煎服一方無黃耆

千金五套丸

出直指方

治反胃胸膈滿宿滯不消停痰留飲

頭眩臂疼露冷風瘴之氣

南星

二兩每個切十餘塊

良薑

一兩半夏

切研用二兩以水同浸三日逐日換水一次



用白礬  
二兩研

乾薑

白朮

茯苓

各一兩

丁香

木香

青皮

檳榔

各半兩

右為末用神麴一兩大麥芽二兩同末打糊丸如梧  
子大每服五七十九米飲下一方無良薑

華撥丸

治胃家氣虛冷大便秘澀臍腹多痛

方見脾胃門洩

痢類

和中丸

出永類  
鈴方

治和胃氣吐瀉

石蓮肉

茯苓

各二兩半

藿香

人參

白扁豆

大

麻 木香 白朮 甘草

各半  
兩炙

右咬咀每服四錢水一鍾薑三片煎服

人參丸

出聖  
惠方

治胃中虛冷氣上奔胃中憤悶腹中疼痛

吐痢宿水甚效

人參

去  
蘆

桂心

乾薑

炮  
製

白茯苓

陳皮

湯浸  
去白

白朮

木香

各半  
兩

訶梨勒皮

一  
兩厚朴

一兩去皮  
薑汁炙

右為末煉蜜丸如梧桐子大每食前米飲下三十丸

養胃湯

出簡  
易方

養胃正陽溫中調氣內逐陰冷滯氣外辟

風寒嵐瘴常服春無感冒秋不生瘡痢冬不致感寒

橘紅

三兩

甘草

一兩炙

厚朴

去皮薑汁炙

蒼朮

各一兩去皮泔浸

人

參

茯苓

藿香

草果

各半兩

半夏

一兩湯炮七次

右咬咀每服四錢水盞半生薑七片烏梅一箇煎六

分去滓熱服

禹餘糧丸

醫方大成

治下痢滑數肌肉消瘦飲食不入脈細

皮寒氣少不能言有時發虛熱由脾胃虛耗則氣奪

由穀氣不入胃胃無以養故形氣消索五臟之液不

收謂之五虛此為難治

禹餘糧

煨

赤石脂

煨

龍骨

葶撥

訶子

麵包煨

乾

薑

肉豆蔻

麵包煨

附子

炮去皮臍各等分

右為末醋糊丸梧桐子大每服七十九食前米飲下

沉香湯

出聖濟總錄

治胃氣虛冷不思飲食及冷氣攻腹脇

痛四肢少力口吐酸水喫食無味

沉香

剉

白豆蔻

各一兩去皮

青皮

一兩半

高良薑

半兩桂一兩

吳茱萸

厚朴

各三兩去粗皮

檳榔

剉

右呖咀每服二錢水一大鍾煎七分去滓溫服不拘

時

烏頭湯

出聖濟總錄

治胃氣虛冷不思飲食脇肋滿胸膈不

快臟腑不利

烏頭

炮去皮臍

益智

各三兩去皮炒

木香

訶梨勒

各半兩去核

山

芋二  
栗米

五合

白鹽

一兩炒

青橘皮

一兩半湯浸去白焙

右呖咀每服三錢水一大盞煎七分濾去滓放溫食

前服

白朮八味散 治胃虛苦饑寒痛

白朮 厚朴 人參 吳茱萸 麥蘖炒 茯苓

芎藭

橘皮

各三兩

右搗羅為細末食前服方寸匕煖酒進之隨性服忌

桃李雀肉大醉

平胃散

出千金方

凡身倦不得食食無味心下虛滿時時欲

下喜臥者皆宜

杏仁

五十枚

丹參

三兩

苦參

葶藶

玄參

各三兩

芎藭

桂心

各一兩

右為末煉蜜丸梧桐子大酒服五九日三以止為度

參苓白朮散

出直指方

治虛勞胃弱飲食不進嘔吐洩瀉及

大病後調助脾胃

人參 白茯苓 白朮 甘草 炒 山藥 各三兩 白扁

豆 一兩半製 縮砂 蓮子肉 桔梗 炒 薏苡仁 各一兩

右搗羅為末每服二錢棗薑畧煎服小兒量歲數與之此藥中和不熱久服養氣育神醒脾悅色順正辟

邪

香朴丸 治腸腹虛冷洩瀉注下無度虛氣閉不進飲

食

厚朴

五兩薑汁炒

白朮

三兩

茴香

炒

陳皮

各三兩

訶子

炮去核

赤石脂

各一兩半煨

右為末麵糊丸梧子大每服以五十丸空心米湯下

常服煖腸胃

丁香湯

出聖濟總錄

治胃中虛冷霍亂吐瀉煩熱發渴下痢



赤白

丁香皮

二兩

白朮

四兩

甘草

一兩

草豆蔻

五兩

乾薑

半兩

枇杷

杷葉

二十片  
去毛

右㕮咀每服三錢水一盞生薑三片煎七分去滓食

前溫服

豆蔻湯

出聖濟  
總錄

治胃虛冷嘔逆

草豆蔻

一兩半

桂

半兩

生薑

三分

甘草

炙

丁香

各一兩半

附子

炮去  
皮臍

右㕮咀每服五錢水一盞半棗一枚擘煎八分去滓

溫服

理中湯

出直指方

治腸胃虛弱腹內痛身體怯寒洩瀉青黑

兼治傷寒挾寒而利臍下冷名驚瘡證

人參 白朮

乾薑 甘草

各一兩炙

加茯苓

厚朴

各二兩  
薑製

右㕮咀每服三錢水一盞煎空心服

六君子湯

出危氏方

治臟腑虛怯心腹脹滿嘔噦不食腹洩

瀉

人參 甘草 白茯苓 白朮 肉豆蔻

紙裏煨

訶

子

各等分  
煨去核

右㕮咀每服三錢生薑三片棗子二枚同煎或為末

鹽湯下

調中湯 治胃氣虛不欲食四肢重短氣調和五臟并

療諸病

薤白

一升切

枳實

六枚

陳皮

大棗

粳米

三合

香豉

六合

右枳實橘皮棗以水六升煮薤得四升內米豉煮取一升半邊寒溫服中分服之

厚朴散

出聖惠方

治胃中虛冷氣攻腹脇脹悶食久不消

厚朴

三兩去粗皮薑汁炙

肉豆蔻

三錢去殼

訶梨皮

一兩煨

木香

檳榔

陳橘皮

各三錢湯浸去白焙

右為散每服三錢水一中盞生薑半分棗三枚煎六分去滓食前稍熱服

厚朴丸

治胃氣虛冷臍腹疼痛或洩瀉下痢并不思

飲食

方見脾臟門  
脾虛冷類

川椒丸

治臟虛洩瀉無度胃寒

黃連

炒

烏梅肉

當歸

川椒

炒去汗

桂心

乾薑

各等  
分炮

右為末糊丸如梧子大每服三五丸空心米湯服

訶梨勒湯

出聖濟  
總錄

治胃氣虛冷腹瀉

訶梨勒

五枚炮  
去核

大腹

五枚  
剉

草薢

十四箇  
去皮

甘草

炙  
白

术人參

各半  
兩

右呖咀每服三錢水一盞薑三片棗一枚煎七分去

滓食前服

厚朴湯

出聖濟方

治胃冷嘔逆

厚朴

去粗皮薑汁炒

白朮

桂

各三兩去粗皮

丁香

半兩

桃仁

半兩去皮

双仁不用炒

右呖咀每服三錢水一盞煎七分酸醋濾去滓熱呷

丁香湯

出聖濟方

治胃寒胸膈虛滿面目浮飲食不化

丁香 藿香葉 附子

各一兩炮去皮臍

乾薑

半兩炮

右咬咀水一升煎五合去滓徐徐呷盡

丁香散

出本  
事方

開胃進食

丁香

四十  
九粒

藿香

半兩

巴豆

二十粒去  
殼取肉

粟米

一合

右先將粟米巴豆肉同炒令赤色去巴豆不用只使粟米與丁香藿香同研為末每服二錢米調下

藿香半夏散

出和  
劑方

治胃虛中寒停痰留飲噦逆嘔吐胸

滿噎痞短氣倦怠不入飲食

丁香皮

半兩

藿香葉

一兩

半夏

二兩湯浸七  
次炒黃色

右呖咀每服二錢水一盞薑七片煎七分去滓溫服  
食前

火輪丸

出醫方大成

治腸胃虛寒心腹冷痛洩瀉不止

乾薑

炮

附子

炮去皮

肉豆蔻

各等分麴裏煨

右為末米糊丸如桐子大每服五十九空心米飲下

白朮附子湯

出永類鈐方

治腸胃虛寒腸鳴洩瀉或自多汗

白朮

二兩

附子

炮各一兩去皮

茯苓

右為散四錢水盞半薑七片棗一枚煎七分去滓溫



服無時

治胃冷嘔逆氣厥不通

出十便良方

母丁香

三粒炒

陳橘皮

一隻全者湯浸去白焙

右用水一盞取半盞去滓熱服

治患胃虛并嘔吐食及水者

出本草

白梁米

汁二合

生薑

汁一合

右服之性微寒除胸膈中客熱止五臟氣續筋骨

猪臟丸 治臟寒洩瀉飲食氣體倦怠

# 吳茱萸

右用殭豬臟頭一截去脂膜淨洗將茱萸入臟內兩頭扎定溫火煮令極爛用甑蒸熟尤好二味于臼搗千下令極細丸梧桐子大每服五丸米飲下

平胃氣和中益五臟

用鯽魚和茱萸作羹食良

蓼酒

出十便良方

治胃管不能飲食耳目不聰明四肢有氣

冬臥脚冷服此酒十月後目既精神體又充壯

用八月三日取蓼曝燥把之如五升大六十把水六石煮一石去滓釀酒如常法隨多少飲之其効甚速  
治元臟傷冷及開胃

用附子炒過去尖搗為末水二盞入藥二錢鹽及生薑同煎取一盞空心服

治胃氣冷喫食即欲得吐

用白豆蔻子三枚研細好酒一盞微溫調併飲三二盞佳

薑胃湯 治胃主虛羸不生肌肉水氣在臍下不能飲

食及四肢煩熱

用羊胃一枚與肉一觔切以水二斗煮取九升每服一升三日盡便作兩劑乃差肉多入湯

治胃主虛羸風熱不能食

用生薑取汁拌雞子生地黃少許蜜一匙頭和水三

合頓服立差

溫胃煮散

出聖濟總錄

治胃虛冷中脘氣滿不能傳化善饑

不能食

人參末

錢二

生附子末

錢半

生薑

一分

均和勻用水七合煎

二合雞子一枚取清打轉空心服

厚朴丸

一名八味厚朴丸米飲下

治胃氣虛冷饑瘦少力不思飲食

方見脾臟門脾胃虛冷水穀不化類

順氣湯

一名溫氣煮散

治胃氣虛冷腹脇脹滿痰逆不思飲食

方見脾臟門虛冷類

草豆蔻散

出王氏博濟方

治胃口冷喫食無味及脾洩瀉不止

蕪大治酒後數圓如痢心胸不快不思飲食

草豆蔻

半兩每個  
煨焦黃

肉桂

一兩

甘草

一兩  
炙

陳皮

一兩  
去白

薑

一兩

右件為細末每服一錢半更下陳米末一錢棗一枚  
同煎至七分溫服其滓再煎服

調中散

出楊子建萬  
全護命方

治胃氣虛冷少思飲食面色痿黃

口無滋味非時吐吐出清水頻發泄瀉忽時下黃沫白  
沫嘔逆惡心身多寒慄唇皮無光肌膚不澤腸內虛

鳴心腹刺痛忽然心中沉冷胸膈不安一切脾胃虛冷證候並宜服之

蓬莪茂

京三稜

各三分

甘草

黃檗皮

一兩

獨活

芎藭 防風

桔梗

白芷

白朮

木香

各一兩

青檣皮

三錢

右細杵為末每服二錢空心入溫鹽煎點任意喫

又方治胃氣虛風邪攻之食即嘔逆食不進腹大泄

瀉面黃消瘦方

出楊子建萬全護命方

訶子

一兩 麵裹  
炮只用皮

船上黃

二兩

肉苁蓉

吳茱萸

防

風

厚朴

川芎

蒼朮

藿香

獨活

右細杵羅為末煉蜜丸如梧子大空心米湯下三十丸

治胃冷口常酸水心下連臍痛立效

出徐居  
士選方

厚朴

一兩生薑汁  
合塗炙為末

葶撥

半兩炒  
為末

右相合入熟烏鯽魚研和為丸如棗豆大每日米飲下二十九丸



補胃

出本草

以羊肥肚羹食三五度

溫中

出本草

以糯米飲食之

胃熱腸寒

附論

夫腸胃相通疾病相連人因飲食不節寒溫失宜致腸胃受邪有冷有熱疾證但見食則善饑小腸痛脹為胃熱腸寒之病胃熱則消穀故善饑腸寒則血凝脈急故

小腹痛又寒則氣裂故痛且脹

麥門冬湯

出聖濟總錄

治胃熱腸寒善食數飲小腹脹痛

麥門冬

去心

甘草

各二兩

羌活

白茯苓

旋覆花

玄參

白朮

芍藥

柴胡

人參

升麻

桑

白皮

當歸

各一兩

胡黃連

木香

熟地黃

一兩

右咬咀每服三錢水一盞入甘草一寸煎八分去滓

溫服不拘時候

黃耆湯

出聖濟總錄

治胃熱腸寒食已腹饑小腹脹分氣

黃耆

半兩

人參

白朮

白茯苓

京三稜

芎藭

陳皮

去白

麥門冬

去心

訶子

前胡

桔梗

柴胡

各半兩

牡丹皮

甘草

芍藥

各三錢

右㕮咀每服三錢水一盞生薑三片煎七分去滓溫服

無時

半夏湯

出聖濟總錄

治胃熱腸寒冷熱不勻善食數饑小腸

脹痛

半夏

麥門冬

去心

人參

白茯苓

桔梗

青皮

柴胡 防風 前胡 細辛 款冬花 紫苑

白芷 各一兩 枳殼 厚朴

右咬咀每服三錢水一盞半生薑三片煎一盞去滓  
熱服

京三稜煎丸 出聖濟總錄 治胃熱腸寒食已腹饑小腸痛

京三稜 三兩 石砂 一兩飛過以三稜同用米醋三升煎成膏 當歸 大黃

鱉甲 去裙醋炙 五靈脂 木香 沉香 各半兩 檳榔

桂 乾漆 各三錢 沒藥 馬蘭花 各一錢 蓬朮 一兩炮

右為末入三稜煎九菜豆大每服七丸空心臨卧溫酒或鹽湯下

前胡木香湯

出聖濟總錄

治胃熱腸寒善食數饑小腹脹痛

前胡木香

柴胡秦艽桂

懷香子

各一兩炒

檳榔

三個麩裏煨

肉豆蔻

三個

芫荽

甘草

青皮

葶

薤

各半兩

右咬咀每服四錢水一盞半薑三片煎一盞去滓溫

服

沉香散

出聖濟總錄

治胃熱腸寒食已饑小腹痛

沉香

白檀香

烏藥

山芋

甘草

白茯苓

京三稜

前胡

桔梗

各半兩

人參

右為末每服一錢入鹽少許沸湯點服不拘時

地黃湯

出聖濟總錄

治胃熱腸寒善食數饑小腸痛脹

熟地人參白茯苓

麥門冬

枇杷葉

去毛

地

骨皮

甘草

炙

石斛

黃耆

各等分

右咬咀每服一錢水盞半煎七分去滓服不拘時

芍藥丸

出聖濟  
總錄

治胃熱腸寒善饑小腹痛脹

芍藥 人參 赤芍藥 厚朴

各三兩  
薑汁炙

陳皮 木

香 桂 桔梗

右為末煉蜜丸如梧子大每服二十九食前米飲下

日二

立通丸

一名青  
橘皮丸

治胃熱腸寒善食數饑小腹痛大便

或澀

出聖宣  
明論

京三稜 黃連 青皮 蓬莪朮

各一兩

巴豆霜

右為末麵糊丸菴豆大每服五丸食後茶酒任下

調中湯

出聖濟總錄

治胃熱腸寒食已輒饑小腹痛脹

人參

白茯苓

各十兩

紫河車

甘草

各二兩  
生用

右咬咀每服三錢水一盞煎至七分去滓空心食前  
溫服

胃寒腸熱

附論

夫病有腹脹而洩為胃寒腸熱胃受寒則氣脈不行而  
為脹滿腸客熱則水穀不聚而為洩注病本濁寒之氣



在上清熱之氣在下故脹而且洩

大腹木香湯

出聖濟總錄

治胃寒腸熱腹洩痢

大腹皮

前胡

木香

半夏

各二兩

白朮

白芷

桂

陳皮

玄胡索

當歸

旋覆花

甘草

炙

柴胡

芍藥

各半兩

乾薑

人參

各三錢

右咬咀每服三錢水一盞生薑三片棗三枚擘破煎

六分去滓稍熱食前服

香檳丸

出聖濟總錄

治胃寒腸熱腹脹洩利

丁香

六錢

青皮

半兩

硃砂

細研水飛一

木香

京三稜

蓬

朮

縮砂

陳皮

桂

各半兩

烏梅

二兩

巴豆

二十二枚去皮

同烏梅一處搗

右為末麵糊丸棗豆大每服十五丸食後溫生薑湯

下

溫胃丸

出聖濟總錄

治胃寒腸熱腹脹洩痢調氣

半夏

二兩湯洗七次

肉豆蔻

桂

人參

各半兩

訶子

良

薑

各一錢

木香

陳皮

去白

蜜

棗子肉

各一兩

生薑

汁一

薑入蜜棗

熬為膏

右為末用薑蜜棗膏丸如梧子大每服十九丸米飲下

生薑湯送下亦得

訶梨勒湯

出聖濟總錄

治胃寒腸熱腹滿悶洩瀉不止

訶子

一兩半

大黃

半兩

青皮

半兩

良薑

半兩

甘草

一錢

防風

一錢

枳殼

半兩

薑

一錢

厚朴

半兩

陳皮

半兩

陳皮

三錢

右為呔咀每服三錢水一盞半薑棗煎七分去滓溫

服不計時

厚朴丸

出聖濟總錄

治胃寒腸熱腹脹洩痢

厚朴

一兩半薑汁製

龍骨

訶子

乾薑

附子

去皮臍炮

黃

連

白石脂

吳茱萸

各一兩

右為末醋浸炊餅丸梧桐子大每服三十丸空心煎茱萸湯下米飲亦得日三

當歸黃連丸

出聖濟總錄

治胃寒腸熱腹脹洩痢

當歸

黃連

二兩

木香

吳茱萸

炒

赤茯苓

厚朴

薑汁炙

訶子

各一兩

右為末煉蜜丸梧桐子大每服三十丸食前米飲下

日三

和胃丸

出聖濟總錄

治胃寒腸熱腹脹洩痢

半夏

牽牛

各半兩炒

生薑

一人兩

人參

礬蝴蝶

藿香

各半兩

丁香

右先將半夏牽牛生薑于銀石器內慢火煮候水盡  
焙乾與人參等藥同杵為末用生薑汁煮麵糊丸梧  
桐子大每服二十九空心生薑米湯下

妙應丸

出宣明論

治胃寒腸熱腹脹洩利水穀不化痞滿不

已

烏頭

半兩去皮  
臍生用

梔子

一錢  
去皮

乾薑

一錢  
生用

右為末用生薑自然汁丸如梧桐子大每服七丸溫

酒下食前服

益腸胃

出本草

用越瓜和飲作鮓并蘆菹亦得

胃中宿食

附論

夫凡病宿食在上管當吐之脈數而滑者實也有宿不  
消下之愈中有澀食冷物即痛不能食有熱物即卻食  
大腹有宿食寒慄發熱如瘧狀宿食在小腹者當暮發  
熱明旦復止寸脈緊即頭痛風寒或腹中宿食不化寸  
口脈緊者如轉索左右無常脾胃中宿食不消寸口  
脈浮而大按之反澀故知宿食

大麴蘖丸

出千金方

主消穀斷下溫和又寒冷者長服不患

霍亂

麥芽

麴

各一升

附子

乾薑

當歸

人參

各三兩

赤石脂

一斤

桔梗

瓜蒌

各二兩

吳茱萸

皂莢

各五兩

椒

二兩半

烏梅

五十個

右為末蜜酢中半漬梅一宿蒸三斗米許去核搗如泥和藥再搗三千杵丸如梧子大每服十丸白湯下日三下甚者加龍骨阿膠艾各三兩

乾薑散

出千金方

治不能食心意冥然忘食

乾薑

法麴

蜀椒

大麥芽

豉

各一升



右為末食後米飲服方寸七日三以能食為度

消食斷下丸

出千金方

治數年不能食寒冷者常服

之

麴

大麥芽

各一升

吳茱萸

四兩

右為末蜜丸如梧子大每服五十丸白湯日三服

麴蘖散

出千金方

消穀能令除腸中水氣腹脹

法麴

麥芽

杏仁

各五兩

右為末食後酒服一合日三

開胃生薑丸

治中焦不和胃寒水穀不化噫氣不通

噎塞痞滿口淡吞酸食時臍脹噦逆惡心嘔吐痰水

宿食不消噎脇肋刺痛寬中開胃進美飲食

桂心

一兩

甘草

二兩炙

生薑

一觔切鹽三兩淹一宿焙乾

青皮

去白陳

皮

各二兩去白

廣茂

當歸

縮砂

四十個

右為末煉蜜丸如彈子大每服一九食前細嚼沸湯

化下

平胃丸

出千金方

治丈夫小兒食實不消胃氣不調或溫濕

熱結大小便不利者有病冷者服露宿丸熱藥後當  
進此丸調胃

葶藶

各一兩

杏仁

五十枚

大黃

二兩

小草

甘草

芍藥

芎藭

各一兩

右為末蜜丸桐子大每服五丸米飲下日三一歲小  
兒二丸漸加之千金翼有菖蒲當歸乾薑茯苓麥  
門冬細辛為十二味無杏仁

調中益五臟開胃令人能食

出本草

以草鼓食之

利五臟健胃令人能食

以蛆煮食之以飯壓之不爾令人口乾

開胃消食

出本草

以蓮藕生研服之

開胃通心膈

出本草

以麥芽炙作熟水飲

主開胃

出本草

以蓮藕蒸煮食之良

開胃通利五臟

用鰻魚煮食久食令人肥健而開胃

鰻魚似鯉身圓頭扁骨軟生江

海水

調中消食去惡氣

用羅勒生食之

即蘭香也味辛溫有小毒

食亦論

夫內經曰大腸移熱于胃善食而瘦故謂之食亦胃移

熱于膽亦曰食亦胃為水穀之海所以化氣味而為榮  
衛者也胃氣和則飲食有節精血盛而膚革充盈若  
乃胃受邪熱消燍穀氣不能變精血故善食而瘦也病  
名食亦言雖能食亦若饑也胃移熱于膽亦曰食亦以  
膽為陽木熱氣乘之則燍土而消穀也

甘露飲

出聖濟  
總錄

治胃熱善食不生肌

生地

熟地

天門冬

去心

麥門冬

去心

枇杷葉

去毛

黃芩

石斛

甘草

炙

枳殼

麤炒

山茵陳

各一兩

右咬咀每服三錢水一盞煎七分去滓食後溫服日

三

升麻湯

出聖濟  
總錄

治胃熱健食消穀善饑不生肌肉病名

食亦

升麻

梔子仁

射干

赤茯苓

各三兩

芍藥

四兩

朮

五兩

生地黃

蜜

各一升

右咬咀六味如麻豆大每服五錢水一盞半煎一盞

去滓加地黃汁半合再煎兩沸次下淨白蜜半匙共

煎取一盞溫服老少加減

沉香湯

出聖濟總錄

治胃熱消穀善飲不為肌膚

沉香 人參 麥門冬去心 地骨皮 小草 生甘

草 生地黃

各一兩

右咬咀每服五錢水一盞半煎八分去滓溫服日三

不拘時

參苓丸

出宣明論

治胃中熱結消穀善食不生肌肉

人參 赤茯苓 菖蒲 遠志去心 地骨皮 牛膝



各一兩酒

浸切焙

右為末煉蜜丸如梧子大每服二十九丸溫米飲下日

三不拘時候服

乾地黃湯

出聖濟總錄

治胃熱善食而瘦病名食亦

地黃

麥門冬

去心

枯薑根

各三兩

甘草

炙

枳殼

黃

苓

各一兩

右咬咀每服五錢水一盞半煎七分去滓溫服日二

三

噫酸

附論

夫上焦有留飲脾胃挾宿寒致飲食滯于膈腕不能傳化令人脹滿氣逆所以噫酸也

和胃丸

出聖濟總錄

治噫酸惡心痰飲嘔逆不思飲食

方見脾胃

門兼理

脾胃類

丁香散

出聖濟總錄

治脾胃虛弱噫氣吞酸食飲遲化

丁香

縮砂

白朮

乾薑

人參

陳皮

去白附

子

各二兩炮去皮臍

高良薑

桂檳榔

白豆蔻

陳

麴

各半兩

甘草

炙各一錢

木香

右為末每服二錢炒生薑鹽湯下不拘時

丁香煮散

出聖濟總錄

治噫酸吞酸不欲食

丁香

半兩

赤茯苓

桔梗

白朮

白芷

桂

半

夏

薑汁製

甘草

人參

各一兩

乾薑

半兩

檳榔

高良薑

肉豆蔻

枳殼

各一錢

右咬咀每服三錢水一盞半生薑三片棗子一枚煎

至六分去滓溫服

木香平氣丸

聖濟總錄

治心胸有痰噫酸吞酸

木香 沉香 丁香 肉豆蔻 丹砂 射香

各半

兩 檳榔

麴裏慢火煨熟去麴不用

乳香

一兩揀通明者生薑汁內煮軟別研如膏

半

夏

二兩湯浸七次焙乾為末生薑汁和作餅子入藥同研

右除丹砂乳香半夏射香四味別研外將木香等味一處為末次入丹砂射香再拌研勻細後將乳香半夏末入生薑汁煮作薄糊拌和前藥如拌和末就以生薑汁煮糊拌和硬軟得所為度丸如梧桐子大每

服十五丸至二十九食後溫米湯送下

丁香丸

聖濟總錄

治胃寒痰飲噫酸吞酸胸膈妨悶

丁香

母丁香

丹砂

麝香

乾薑

礬石

飛過

附子

炮去皮

吳茱萸

杏仁

炒去皮

硫黃

各一錢

巴豆

十三

枚去皮膜別  
研為膏去油

右研末拌勻用蒸棗肉和劑丸茱萸豆大放乾每服三五丸不拘時溫薑湯下

丁香丸

聖濟總錄

治噫酸吞酸或時惡心懶進飲食

丁香 五味子 半夏 人參 各半 甘草 琥珀

乾薑 各一兩 枳殼 炒 昆布 洗去鹹水 訶子 桂

右為末煉蜜丸梧子大每服三十九丸煎薑橘皮湯下

京三稜丸 聖濟總錄 治噫酸吞酸消積進飲食

京三稜 三兩濕紙裏煨熟 白朮 二兩 丁香 半兩 檳榔 一兩 半夏 四兩

滑 麝香 錢一 丹砂 半兩

右除研為細末入研藥再研令勻以生薑自然汁煮麵糊丸如梧桐子大每服二三十丸木香生薑湯下

無時

丁沉煎丸

和劑方

辟寒邪散胸膈中凝滯調順三焦和養

榮衛治心胸痞悶噫酸吞酸嘔逆痰水津液不收兩  
脇刺痛腹中堅滿口苦無味不思飲食

丁香

十二兩

沉香

二兩

木香

一錢半

陳皮

一兩

白豆蔻

九兩半

右為末別用甘草熬膏子為丸每一兩分作二百五

十丸每一粒含化空心食前常服養榮衛散滯氣

治噫酢咽

肘後方

治人食畢噫酸及醋心

吳茱萸

半兩

人參

二兩

生薑

三兩

大棗

十三枚

右呖咀水六升煮水二升先服一升日再

半夏丸

聖濟總錄

治上焦冷氣噫醋吞酸吐沫嘔逆不思飲

食

半夏

二兩 去滑

丁香

半兩

乾薑

一錢

右為末生薑自然汁煮麵糊為丸梧桐子大每服十

五丸熟水鹽湯下不拘時

又半夏丸

聖濟總錄

治上膈痰滯吞酸吐沫涕唾稠粘胸膈



不利

半夏

二兩用生薑炙

山芋

一兩礬石飛過

右為末用麵糊為丸每服十丸至二十丸食後臨卧生薑湯下

丁香丸

聖濟總錄

治噫酸息臭胸中有痰

丁香

草撥

各一兩

硃砂

半兩研細用百沸湯量多少化研以淨紙濾過八次

磁碗內慢火熬乾

右同研令勻好新黃蠟二兩入甕器內鎔化入上味

攪勻候溫酒通手丸桐子大如硬難丸復近火溫之  
以丹砂一分研為衣每用煨生薑湯下空心夜卧各  
一服三丸逐日加一丸至五丸後三日加一丸至七  
丸止

藿香半夏丸

聖濟  
總錄

治膈中有痰脾胃積冷噫酸吞酸不

思飲食

藿香葉

一分丁香

半夏

五兩薑汁浸  
一宿焙乾

右為末麵糊丸梧桐子大每服十五丸不拘時溫生

薑湯下

薑棗丸

聖濟總錄

治胃寒痰逆噫酸吞酸胸膈不利不思飲

食

生薑

四兩

丁香

附子

各一兩炮去皮臍

右為末用蒸棗肉丸梧桐子大每服十五丸至二十

丸米飲不拘時送下

治胃冷常吐清水醋心

聖濟總錄

乾薑

礬石

各一兩燒過別研

右為末米飲丸如梧桐子大蔥茶下二十九食後服

治醋心

肘後方

橘皮

二兩

檳榔

四兩

右為末空心生薑湯下方寸匕一方蜜湯下

又方

傳信通方用

用胡桃爛嚼以乾薑下之或只嚼胡桃喫乾薑亦可

治

治噎酸漿

用取頭垢漿水煎煮膏服之驗一方水煎服

治酸心每心氣上攻如醋

附後方

用取茱萸一合水三盞煎七分頓服涎濃亦須強服  
近有人心如蜚破服此方後二十年不發

增損成氣丸 療胃脇肋滿背上時有灑熱則痛腹脹  
多噎醋咽氣逆兩脇滿

前胡 枳實 橘皮 大黃 各七 桂心 吳茱萸

乾薑 各五

茯苓 各四

芍藥 各六

厚朴

杏仁

七十個  
去皮炒

右為末內杏仁脂中研爛篩度蜜和丸每服食後  
少時酒飲任性初服七丸如梧子大以氣宣下洩為  
度忌生葱大醋

茯苓湯 治吐酸

茯苓 陳皮 生薑各十分 白朮 甘草 人參

桂心各六分 紫蘊一錢 檳榔七枚

右咬咀水九升煮二升絞去滓分溫三服每服如人  
行六七里未好差三兩日更服一次老小腹微痢忌

生葱酢物雀肉海藻松菜

檳榔散 療吐酸水每食則變作醋水吐出

檳榔 人參 茯苓 陳皮

六分 六分

右為末空腹取生薑五大片合搗絞汁溫內散方寸  
匕攪調頓服旦服漸加至一匕半若利多減以微通  
洩為度忌酢物生冷油膩猪魚等

茯苓湯 療心頭氣結連胸臍皆痛及吐酸水日夜不  
止

茯苓

厚朴

各四兩

檳榔

白朮

各二兩

生薑

十兩

右咬咀水九升煮二升七合絞去滓分溫三服每服相去如人行七八里須利加檳榔末一兩半湯欲熱時內之甚安穩三日服一劑類服六五劑則可停忌酢物桃李雀肉等一方有吳茱萸人參

各三兩

治酢咽

麴末

一升地黃

三觔

右合搗日乾以酒服三寸七日三



白朮散 治食訖醋咽多噫食飲不下及脾胃虛冷

白朮

一兩

吳茱萸

半兩

湯浸七

遍焙乾微炒

高良薑

半兩

兩

右為粗散每服三錢以水一大盞入生薑半分煎至

六分去滓不拘時候稍熱服

前胡丸 治胸脇支滿背上時寒腹脹多噫醋咽逆氣

前胡

一兩半

去蘆頭

枳殼

一兩

麩炒

桂心

一兩

草豆蔻

一兩

去殼

高良薑

二兩

剉

乾薑

半兩

炮製

赤茯苓

一兩

吳茱萸

一兩

湯浸

七遍乾焙

赤芍藥

一兩

川大黃

二兩

剉碎微炒

厚朴

二兩

去粗皮生薑汁

炙令香 杏仁 一兩湯浸去皮尖發麤炒微黃

右為末煉蜜丸搗三二百杵丸如梧桐子大每服不計時候以生薑湯下三十丸

檳榔散 治酸咽吐水及白沫飲食不消腹脹脇滿

檳榔 一兩 厚朴 二兩去粗皮塗生薑汁炙令香熟 甘草 半兩炙 川大

黃 一兩剉碎微炒 白朮 一兩 訶梨勒皮 一兩半湯浸去白焙 陳橘皮 一兩半湯浸去白焙

桂心 一兩 吳茱萸 半兩湯浸七遍焙乾微炒

右製為粗散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎

至六分去滓不計時候稍熱服

檳榔丸 治脾胃氣冷上攻胸膈嘔吐酸水不思飲食

腹脇虛脹

檳榔

半兩

高良薑

三錢

陳橘皮

半兩

湯浸  
去白瓢焙

桂心

一錢

厚

朴

半兩去粗皮生薑汁炙令香熟

訶梨勒皮

半兩

半夏

半兩湯浸去滑

草豆

蔻

半兩去皮

白朮

半兩

右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大不計時

候生薑湯下三十丸

木香散 治脾胃冷氣上攻胸膈切痛醋咽不能下食

木香

一兩去粗皮塗生薑汁炙令香熟

甘草

一兩 陳橘皮 二兩

湯浸去白瓢焙

白朮

二兩 甘草

半兩炙微赤剉

高良薑

半兩剉

前胡

二兩

去蘆頭

右為粗散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候稍熱服

人參散 治食畢即咽醋心胸氣滯腹脇疼痛不能下食

人參

二兩去蘆頭

吳茱萸

半兩洗七遍焙乾微炒

木香

半兩半夏一兩

湯浸洗七遍去滑

陳橘皮

二兩湯浸去白瓢焙

高良薑

一兩判

右為粗散每服三錢以水一中盞生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時稍熱服

半夏散 治醋咽胸中氣塞飲食不下

半夏

半兩湯洗七遍去滑

人參

一兩去蘆頭

赤茯苓

一兩甘草

半兩炙微

赤判 吳茱萸

半兩湯浸七遍焙乾微炒

訶梨勒皮

二兩

右為粗散每服三錢以水一中盞生薑半分棗三枚

煎至六分去滓不計時候稍熱服

陳橘皮散 治噦逆酸咽胸膈不利食少腹脹

陳橘皮

二兩湯浸  
去白瓤焙

白檳榔

一人參  
兩

一兩去  
蘆頭

白朮

一兩

厚朴

一兩半去粗皮塗  
生薑汁炙香熟

右為粗散每服四錢以水一中盞入生薑半分棗

三枚煎至六分去滓不計時候稍熱服

療醋咽

用羌活五兩搗用水一升浸三宿每日溫服五合差

生薑湯 治酒食所傷心胸煩滿口吐酸水多嘔逆飲  
食無味胸膈不快

乾生薑

一觔

白麵

炒三觔

甘草

十三觔炒

杏仁

去皮尖麵炒另研十觔


右炒鹽二十二觔同為末每服半錢如茶點喫常服

一匙消食化痰寬胸膈不拘時候

除胸間酸水

本

以雞蘓作生菜食之



普濟方卷三十五